

NOVA ESPÉCIE DE JACQUEMONTIA CHOISY

por

J. I. FALCÃO

Naturalista do J. Botânico

Em excursão organizada pela Comissão de Estudos da Zona de Influência da Companhia Hidro-Elétrica do São Francisco, nosso colega, HONORIO DA COSTA MONTEIRO NETO, teve oportunidade de coletar, entre outras espécies, uma *Jacquemontia* muito interessante pelas suas características.

Depois de consultarmos a *Flora Brasiliensis* de MARTIUS, Pflanzenfamilien, e outras obras especializadas no assunto, bem como o Herbário do Jardim Botânico, não encontramos espécie alguma cujos caracteres se enquadrassem, perfeitamente, nos da espécie em aprêço. Resolvemos, porisso, considerá-la novidade, batisando-a de *Jacquemontia monteroi* J. I. Falcão em homenagem ao coletor.

Ao Sr. NEWTON PAES LEAL, desenhista do Jardim Botânico, nossos agradecimentos pela estampa que ilustra o nosso trabalho.

Jacquemontia monteroi n. sp.

Frutex scandens, ramis teretibus, juvenilis pilis albosericis, demum glabratis; foliis basi subcordatis, apice mucronulatis, integris, utrinque pilosis, membranaceis, penninerveis, longe-petiolatis; pedicellis circa 5 mm. longis, pilosis, 2-6 floribus; calice campanulato; sepalis membranaceis

(*) Entregue para publicação a 12 de Setembro de 1951.

aequalis, oval-obtusis, externe pilosis; corolla infundibuliforme, glabra, alba, areis episepalicis lilacineis, 1-1,5 cm. longa; ovário glabro; disco hypogino annulare; stigmatibus ovalibus, planis, divergentibus.

Habitat: Brasil: Município de Glória, na Bahia.

Leg.: HONORIO DA COSTA MONTEIRO NETO.

Typus: H. J. B. n.º 74.897.

Trepadeira com ramos cilíndricos, albo-seríceos, quando jovens, e glabros no estado adulto.

Fôlhas penínérveas, pecioladas, com 5 cm de comprimento e 3 cm de largura, membranáceas, de base sub-cordiforme, ápice mucronado e margem inteira, pilosas em ambas as faces, longo-pecioladas; pecíolos de 1-3 cm de comprimento, cilíndricos e pilosos.

Flores (2-6) dispostas em cimeira-umbeliforme. Pedúnculo da inflorescência curtíssimo. Pedicelos com mais ou menos 5 mm de comprimento, pilosos.

Cálice campanulado. Sépalas membranáceas, iguais entre si, ovais, obtusas, externamente pilosas, e internamente glabras.

Corola infundibuliforme, glabra, alba, de 1 a 1 1/2 cm de comprimento, com áreas episepálicas lilás.

Ovário imerso em um disco; estilete glabro. Estígmata ovais, planos, divergentes.

A nova espécie aproxima-se de *Jacquemontia confusa* Meissn, porém, diverge desta pelas diferenças abaixo discriminadas:

<i>Jacquemontia confusa</i> Meissn	<i>Jacquemontia monteroi</i> J. I. Falcão
Pecíolo brevíssimo	Pecíolo longo
Estígmata capitados	Estígmata ovais, planos divergentes
Inflorescência de 1-3 flôres ...	Inflorescência de 2-6 flôres
Disco hipógino nulo	Disco hipógino presente
Pilosidade amarelada, no ramo, cálice e fôlhas.	Pilosidade albo-serícea, no ramo, cálice e fôlhas.

